

# SROVNÁNÍ EFEKTIVITY ERENUMABU PODÁVANÝ PACIENTŮM SAMOPLÁTCŮM VERSUS PACIENTŮM, KTERÝM JE LÉČBA HRAZENA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU


David Doležil <sup>1,2</sup> 1. Headache centrum Městská poliklinika Praha , 2. Headache centrum Praha, DADO MEDICAL sro

**Cíl:** Determinace možných rozdílů v efektivitě erenumabum a complaince léčby erenumabem u pacientů samoplátců oproti pacientům, kterým je léčba hrazena zdravotní pojišťovnou.

**Metodika:** Celkem máme ve sledování 35 samoplátců, z toho 9 mužů (průměrný věk 47,6 let, medián 43,0 let) a 24 žen (47,6 let, medián 54 let), kteří jsou léčeni v našich centrech erenumabem 140 mg každých 12 týdnů subkutánně. Ve skupině 88 pacientů, kterým je léčba hrazena zdravotní pojišťovnou, byla náhodně vybrána srovnatelná skupina 9 mužů (průměrný věk 48,6 let, medián 43 let) a 24 žen (průměrný věk 52,3 let, medián 53 let) s podobnými parametry hodnocení v počtu dnů s migrénou za měsíc (MMD), s vizuální analogovou škálou bolesti (VAS) a věku tak, aby byly obě kohorty porovnatelné. Liší se pouze v ukazateli způsobu úhrady (samoplátcí vs pojišťovny).

Samoplátcí	Počet	Průměrný věk	Medián	Pojištěnci	Počet	Průměrný věk	Medián	Erenumab 140mg	Pojištěnci	Samoplátcí
Muži	9	47,6	43,0	Muži	9	48,6	43,0	Počet aplikací celkem	930	245
Ženy	24	47,6	54,0	Ženy	24	52,3	53,0	Průměrný počet aplikací/ pacient	27	7

**Výsledky:** Obě skupiny pacientů léčených erenumabem, tj. samoplátcí (celkem 245 aplikací) i pacienti léčení na pojišťovnu (930 aplikací), prokázali obdobnou efektivitu ve všech sledovaných ukazatelích: MMD, VAS, Migraine disability assesment (MIDAS), Headache impact test-6 (HIT-6) a dotazníku spokojenosti. Jediný rozdíl jsme našli v častějším přerušení léčby u pacientů samoplátců, jehož důvodem byla vysoká finanční náročnost dlouhodobé léčby.



Vysazení / změna preparátu	Pojištěnci	Samoplátcí
Vyřazeno pro nesplnění kritérií po třech měsících	0	0
Změna preparátu pro nežádoucí účinky	2	0
Ukončeno na vlastní žádost pacienta	0	31
Důvod ukončení na vlastní žádost	0	<b>Finanční náročnost</b>

**Závěr:** Léčba migrény erenumabem prokázala stejnou účinnost u pacientů samoplátců a pacientů, kterým je léčba hrazena zdravotní pojišťovnou. Naše data prokázala očekávanou skutečnost častějšího přerušení léčby u pacientů samoplátců, jehož důvodem je vysoká finanční náročnost dlouhodobé léčby. Tímto způsobem jsme se snažili prokázat, že pacienti léčení na pojišťovnu nenadhodnocují výsledky preventivní léčby migrény erenumabem.