

ÚVOD

Sociální kognice zahrnuje schopnost pochopit a předvídat chování jiných lidí v rámci sociálních interakcí. Atribuční zkreslení je tendence posuzovat záměry ostatních jako nepřátelské a poškozující a ne jako výsledek náhody nebo externích faktorů. Dezinterpretace sociálních situací jako nepřátelských může přispívat k sociální maladaptaci u pacientů s Idiopatickou generalizovanou epilepsií (IGE).

CÍL

Otestovat pacienty s IGE a zdravé dobrovolníky novým testem pro atribuční zkreslení, srovnat výsledky mezi skupinami a identifikovat rizikové faktory.

METODIKA

Do pilotní studie bylo zařazeno 10 pacientů s IGE z Centra pro epilepsie FN Motol a 10 zdravých dobrovolníků (HC). K otestování atribučního zkreslení byla použita nová metodika: Ambiguous intentions hostility questionnaire (AIHQ). Test obsahuje 15 negativních situací - 5 je úmyslných, 5 náhodných a 5 neurčitých. Hodnocení jednotlivých situací je na škále 1-5, kdy čím vyšší skóre, tím je přítomna vyšší míra atribučního zkreslení. Ke screeningu deprese byl použitý dotazník NDDI-E

Ukázka z AIHQ – Ambiguous intentions hostility questionnaire (Combs et. al.)

V obchodním centru procházíte kolem skupinky mladých lidí a slyšíte, že se začnou smát.

Jaký byl podle Vás skutečný důvod, že se začali smát, když jste kolem nich procházel/a?

Myslíte si, že to udělali úmyslně?


Jak moc by Vás to rozzlobilo?

Jak moc byste skupinku vinil/a, že se začali smát, když jste kolem nich procházel/a?


Jak byste se v takové situaci zachoval/a?

	IGE	HC
Pohlaví (M:Ž)	8:2	8:2
Věk – počet let (mean)	39.0	39.7
Vzdělání - počet let (mean)	14.4	16.4
Délka onemocnění - počet let (mean)	25.4	

Protizáchvatová medikace u pacientů s IGE




NDDI-E - deprese u pacientů s epilepsií (cut-off >13)



VÝSLEDKY

Pacienti s IGE dosahovali signifikantně vyšší míru nepřátelského a agresivního atribučního zkreslení v porovnání se zdravými kontrolami, a to zejména v neurčitých situacích ($p < 0.05$)



ZÁVĚR

Atribuční zkreslení je u pacientů s epilepsií dosud neprobádanou oblastí sociální kognice, která může významně přispívat k narušení mezilidské komunikace. Naše výsledky ukazují vyšší míru nepřátelského a agresivního atribučního zkreslení u pacientů s IGE v porovnání se zdravými kontrolami. Tato porucha může přispívat k sociální dysfunkci a tím výrazně ovlivňovat kvalitu života u pacientů s IGE.